

Les étages de la végétation en Corse


Les étages de végétation sont l'expression d'un climat mais aussi d'une flore, et la dualité qui existe dans la flore de notre île explique le fait que nous allons avoir l'association des deux types d'étages de végétation européens en Corse.

On a donc deux sous secteurs floristiques :

- l'un méditerranéo-corse relevant pleinement de la région florale méditerranéenne,
- l'autre oro-corse qui présente de grandes affinités avec les montagnes de la région euro-sibérienne.

A une altitude qui reste assez basse, le climat sec estival et la flore sont de type méditerranéen, à partir de l'étage supra-méditerranéen, on commence à noter la présence d'espèces typiques oro-sibériennes dans les groupements forestiers d'ubac et de secteurs frais.

Rem : L'ubac est celui des versants d'une vallée de montagne qui reçoit la plus courte exposition au soleil direct, à l'inverse, l'adret étant celui des versants d'une vallée de montagne qui bénéficie de la plus longue exposition au soleil.



Etage thermoméditerranéen

(De 1 à 100m d'altitude aux adrets)

Cet étage se caractérise par une température moyenne comprise entre 17 et 19°C, la température minimale étant égale à 5°C. La saison estivale sèche de deux à trois mois favorise l'olivier sauvage, l'asperge blanche, le lentisque, l'euphorbe arborescente, la clématite...

Asperge blanche, *Asparagus albus* L



Euphorbe arborescente, lattone arboru,



Etage mésoméditerranéen

(De 100 à 1000m d'altitude aux adrets, de 0 à 700m aux ubacs)

La température moyenne se situe entre 13 et 16°C, la température minimale étant de 0°C. Cet étage est caractérisé essentiellement par le chêne vert, les maquis à bruyère et arbousier mais aussi par le chêne liège et le pin maritime (adret), le chêne pubescent (ubac), le châtaignier ou encore la lavande, le genêt les cistes et le lentisque.

Arbousier, arbitru, *Arbutus unedo* L.



Lentisque, listincu, macchione, *Pistacia lentiscus* L.



Ciste à feuilles de sauge, mucchju biancu,



Châtaignier, castagnu, *Castanea sativa* Mill



Cistus salviifolius L.

Etage supraméditerranéen

(De 1000 à 1300m aux adrets et de 700 à 1000m aux ubacs)

Température moyenne de 10 à 13°C, T minimale : -3°C

On a ici l'apparition du pin Laricio (adret) et la disparition de l'arbousier, du ciste, de la lavande....On y trouve les chênes vert, sessile et pubescent, l'if (ubac), le pin maritime et la bruyère (adret).

Pin laricio, larice, *Pinus nigra*



Etage subalpin

(De 1600 à 2100m aux ubacs)

Température de 3 à 7°C.

Il est caractérisé par la disparition du hêtre et du pin laricio et par la présence massive de l'aulne odorant.



Aulne odorant, bassu *Alnus alnobetula* (Ehrh.)